VIH - SIDA: RELATO DE UNA EPIDEMIA. FACTORES BIOLOGICOS QUE INTERVINIERON

Ramia, Raúl Guillermo

Servicio de Infectología . Hospital del Milagro. Salta Capital. raulramia@hotmail.com

Origen del VIH. El mismo surge de una mutación de un retrovirus que afectaba a simios produciendo inmunodeficiencia. Se calcula que esto ocurrió a finales de 1930 en Africa. Mantuvo las mismas características moleculares de su especie y por ende los mismos reservorios y mecanismos de transmisión. Ya en el humano el VIH fue diseminándose de forma silente hasta que en la década del 80 aparece inicialmente como una enfermedad nueva comprometiendo el sistema inmune de manera severa en personas previamemente sanas provocando la muerte de las mismas.
Historia de la epidemia: Una vez identificado el agente causal se vío que afectaba a grupos de personas con conductas tales como adictos endovenosos y homosaexuales o enfermedades como los hemofílicos. En menos de 10 años ya habían notificados pacientes enfermos en 190 paises de mundo. A partir de la década del 90 la epidemia se transforma afectando también a heterosexuales y mujeres.
Factores que intervinieron: A pesar de tener vias de transmisión que no compromete ninguna actividad social ni laboral se estructura desde el comienzo de la epidemia un miedo al contagio casua que generó y genera una discriminación para aquel que lo padece. Los tabues sociales acerca de la sexualidad impidieron que las campañas de prevención sean eficaces.
Situación actual: Una persona que vive con VIH-Sida puede conocer su diagnóstico y controlarse llegado el caso con medicación antiviral convirtiendo esta infección en una enfermedad crónica que le permite realizar vida normal.