



Pulso reproductivo de *Rhinella spinulosa* en el Parque Nacional Los Cardones, Salta

Acosta, R.^{1,4}, Guantay, E. A.^{1,4}, Vera Mesones, R.^{2,4}, Núñez, A.^{3,4} y P. Natán^{2,4}.

¹Introducción a la Biología. ²Biología Animal-Zoología General. ³Sistema Educativo e Institucional. ⁴CIUNSa.

Para los anuros de zonas áridas, donde el factor limitante es la disponibilidad de sitios de oviposición, la reproducción ocurrirá cuando comienza la época húmeda del año y dependerá del avance y retroceso de los cuerpos de agua. En el Parque Nacional Los Cardones, se registró la actividad reproductiva de *Rhinella spinulosa* en diferentes ecorregiones, Prepuna y Monte occidental, incluyendo en el análisis un periodo que abarca desde 1995 a 2011. Para cada tipo de ambiente se seleccionaron dos sitios de muestreo, registrándose la actividad reproductiva expresada en la oviposición y presencia de larvas en diferentes estadios metamórficos. Los resultados indican variaciones en la época de actividad reproductiva dependiendo de la ecorregión estudiada. Estos datos sostienen lo descripto para esta zona anteriormente y refuerzan el planteo de un patrón asincrónico entre ecorregiones y sincrónico en las poblaciones pertenecientes a la misma unidad.

Palabras clave: reproducción, *Rhinella spinulosa*, Parque Nacional Los Cardones

